




PACIFICA[®]
PLUS >>

Pacifica[®] Plus

— Der Alptraum für Fuchschwanz, Raygras, Windhalm, Klebern, Mohn und Co.



Dreifachschlag gegen Ungräser und Unkräuter

Ackerfuchsschwanz, Raygras und Windhalm sind lästige Gäste in Getreidekulturen. Doch mit Pacifica® Plus kann der Landwirt wirksam gegen diese Ungräser und viele Unkräuter vorgehen. Grund: Das Herbizid beruht auf einer erfolgreichen Wirkstoffkombination.



stellt Pacifica® Plus keine besonderen Ansprüche.

» **Die Effekte:** Alle Wirkstoffe sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich ideal ergänzen. Ungräser und Unkräuter stellen ihr Wachstum ein. Dann sterben sie allmählich ab, auch wenn dieser Vorgang einige Wochen dauern kann, geht keine Gefahr mehr von den Schädipflanzen aus.

» **Die Wirkung:** Die Komplettlösung setzt sich aus 3 Wirkstoffen und einem Safener zusammen. Mit Mesosulfuron lassen sich Ungräser wie Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Raygras attackieren. Die beiden Wirkstoffe Amidosulfuron und Iodosulfuron wirken hervorragend gegen viele Unkräuter wie Klebern, Hohlzahn, Stiefmütterchen, Mohn, Kamillen, Knöteriche, Ampferarten und Ackerkratzdisteln.

» **Die Vorteile:** Die Wirkstoffkombination ist ein sicheres Mittel gegen Ungräser und Unkräuter zugleich. Pacifica® Plus verfügt über ein sehr breites Wirkungsspektrum und stellt darum eine äusserst komfortable Lösung dar. Pacifica Plus haftet dank dem Zusatz von Mero an den Pflanzen gut und entfaltet damit auch auf kleinen Zielflächen eine hohe Blattaktivität. Einzige Voraussetzung ist ein aktives Wachstum. An die Temperatur

» **Der Nutzen:** Selbst hartnäckige Ungräser und Unkräuter haben keine Chance. Der Konkurrenzdruck gegenüber der Getreidekultur wird durch diesen Dreifachschlag gezielt beseitigt. Pacifica Plus ist einfach anzuwenden und in den bewilligten Getreidekulturen äusserst Verträglich in der Anwendung.

Einsatzschwerpunkt für Pacifica® Plus



Ackerfuchsschwanz



Raygras




Windhalm




Rispengras, Einj.




Ackerkratzdistel



Ampfer (Blacke)




Ackerstiefmütterchen



Klettenlabkraut



Kamille-Arten



Knöteriche



Mohn



Taubnessel




Gräser sicher bekämpfen
Breites Anwendungsspektrum
Beste Verträglichkeit

Wirkungsspektrum von Pacifica® Plus


Samenunkräuter

Ackersenf
Ehrenpreis
Gänsedistel
Hederich
Hirtentäschel
Hohlzahn
Kamillen
Klebern
Knöteriche
Kornblume
Kreuzkraut
Melden
Mohn
Stiefmütterchen
Storchenschnabel
Taubnesseln
Vergissmeinnicht
Vogelmiere
Wicken



Diverse Ungräser

Raygräser
Trespen¹




Einjährige Ungräser

Ackerfuchsschwanz
Flughafener
Rispengras, Einjähriges
Windhalm




Mehrwährige Unkräuter

Ackerdistel
Ampferarten
Winden




Diverse

Ambrosia
Ausfallkartoffeln
Ausfallraps
Ausfallsonnenblumen



Wirkung

Sehr gut
Gut
Ausreichend
Nicht ausreichend
¹ Beratung anfordern



das Getreideherbizid

Wirkstoffe in Pacifica® Plus

5% Amidosulfuron
3% Mesosulfuron-methyl
1% Iodosulfuron-methyl-Natrium
9% Mefenpyr-Diethyl (Safner)

Formulierung

WG (Wasserdispergierbares Granulat)

Empfohlene Kulturen

Weizen, Hartweizen, Triticale

Aufwandmenge

0,3–0,4 kg/ha Pacifica® Plus
+ 1 l/ha Mero in Weizen, Hartweizen und Triticale

Anwendungsfenster

Frühjahr: Nachauflauf
3-Blatt bis 2 Knoten des Getreides (BBCH 13–32)

Gebindegrößen

1 kg (10 x 1 kg)

Agronomische Auflagen

Tankmischung: Pacifica® Plus
+ 1 l/ha Mero (Netzmittel)

Anwendungsempfehlungen für Pacifica Plus

Winterweizen, Hartweizen, Triticale:

0,3–0,4 kg/ha Pacifica® Plus + 1 l/ha Mero gegen Ungräser und Unkräuter im Frühjahr zwischen dem 3-Blatt-Stadium und 2-Knotenstadium des Getreides (BBCH 13–32). Tiefere Dosierung gegen Windhalm und Rispengräser. Höhere Dosierung bei starkem Auftreten von Ackerfuchsschwanz und Raygras. Bei Verdacht auf Resistenz (Windhalm) gegenüber Sulfonylharnstoffen 0,5–0,8 kg/ha Artist® beimischen.

Sommerweizen:

0,3 kg/ha Pacifica® Plus + 1 l/ha Mero gegen Ungräser und Unkräuter zwischen dem 3-Blattstadium und 2-Knotenstadium des Getreides (BBCH 13–32). Bei Verdacht auf Resistenz (Windhalm) gegenüber Sulfonylharnstoffen, sowie gegen Ehrenpreis, 0,5 kg/ha Artist® beimischen.

Wichtiger Hinweis:

Beim Zusatz von Artist® unbedingt auf trockene Pflanzen behandeln. Nach der Anwendung sollte mindestens während fünf Stunden kein Regen fallen.





Bayer CropScience

Bayer (Schweiz) AG
CropScience
Postfach 216
3052 Zollikofen

Telefon: 031 869 16 66
www.agrar.bayer.ch

Pacifica Plus enthält Amidosulfuron, Mesosulfuron, Iodosulfuron und Mefenpyr-Diethyl (Safner).
Gefahren- und Sicherheitshinweise auf den Packungen beachten.